



レブロジル®を投与される 患者さんへ

監修: 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院
血液・腫瘍内科 副院長
小川 亮介 先生

 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社

注: レブロジルは米国Celgene Corporation (Bristol-Myers Squibbの関係会社)の登録商標です。

はじめに

レブロジル[®]は骨髄異形成症候群(MDS)に伴う貧血の治療薬です。

この冊子ではレブロジル[®]で治療されるMDSの患者さんへ、お薬のはたらきや投与方法、副作用などを紹介します。

MDSでは一見して貧血とは思えないような症状がみられたり、症状に慣れてしまい自覚しにくくなっていることもあります。

ふだんの生活で不安なことや悩みがあってもおひとりで抱え込まず、主治医または看護師・薬剤師に相談しながら治療を続けていきましょう。



目次

レボロジル[®]で治療を開始する前に P.4

レボロジル[®]のはたらき P.5

レボロジル[®]の主な副作用 P.6

レボロジル[®]の投与方法 P.8

自分の体調を伝える P.14

高額療養費制度とは？ P.16



レブロジル®で治療を開始する前に

レブロジル®の投与対象となる患者さん

▶ 骨髄異形成症候群に伴う貧血のある患者さん

以下に該当する患者さんは、治療開始前に主治医にお伝えください。

妊娠している、または今後妊娠を検討している




授乳している



レブロジル®のはたらき

骨髄異形成症候群(MDS)では、造血幹細胞が異常になり、正常にはたらく赤血球が少なくなることで、貧血症状があらわれます。



レブロジル®のはたらきにより、
正常な赤血球の数が増加すると考えられています。

レブロジル®電子添文

レボロジル®の主な副作用

よくみられる副作用

吐き気・嘔吐



頭痛



高血圧



注射部位反応
(紅斑、痛み、かゆみ、発疹、腫れ)



疲労



それ以外にも以下のような症状が出ることがあります

頭部

- めまい
(ふわふわと浮く
ようなめまい)

呼吸器


- 呼吸困難

消化器

- 嘔吐
- 肝機能検査値
(ALT、AST)の
増加
- 下痢

全身

- 筋肉痛
- 骨痛
- 好中球減少症
- 血小板減少症
- 力が入らない
- そう痒症
- 疼痛
- 高尿酸血症




ここで示した副作用がレプロジル®でみられる副作用の
すべてではありません。

気になる症状があれば、主治医または看護師・薬剤師に
相談しましょう。

レブロジル®の投与方法

レブロジル®は3週間間隔で皮下注射します




レブロジル®の投与量は体重により異なります

- 投与量によっては、2～3か所に注射することがあります。



レブロジル®は患者さんの状態にあわせて用量調節ができます

増量の場合



治療中に貧血症状の改善
が感じられない場合は、主治医
または看護師・薬剤師に
相談しましょう。

主治医にお伝えするポイントは
14,15ページを参照ください。



効果が見られない場合

増量

3回目



- 同じ用量を2回投与して効果が見られない場合は1段階増量します。
- 同様に、2段階まで増量可能です。



レブロジル[®]は患者さんの状態にあわせて用量調節ができます

減量の場合



投与量については主治医が判断します。レブロジル[®]投与後に気になる症状があれば主治医に相談しましょう。

ご自身の判断で通院頻度を変更しないようにしましょう。

主治医にお伝えするポイントは14,15ページを参照ください。



- ・ヘモグロビン濃度が一定値を超える場合
- ・ヘモグロビン濃度の急激な上昇が認められた場合
- ・副作用がみられた場合



減量・
投与中断

減量または一旦投与を
中断することがあります。



主治医に投与後の 体調の変化について 話してみましょう



ポイント①
投与後、症状に変化はありましたか？



少し良くなった



あまり変わらない



悪くなった



ポイント② 投与後に気になる副作用はありましたか？



気持ち悪くなった



だるくなった



注射した部位が痛くなった

レブロジル®の主な副作用は6,7ページを参照ください。

高額療養費制度とは？

医療機関や薬局の窓口で支払った
を超えた場合にその超えた金額を



■ 自己負担額は医療費総額が増えると当然増加する

医療費

自己負担が3割～1割でも、がんなどの重い病気や大きなケガ、治療が長期になる場合は医療費の総額が増えるので、当然、自己負担の金額も増加します。

医療保険負担


そこで、自己負担額の上限を決め、それ以上かかった金額を支給し、患者さんの負担を軽減するしくみが高額療養費制度なのです。

自己負担

自己負担額の上限

金額が、ひと月で自己負担の上限額 支給する制度です

〈例〉70歳以上・年収約370～770万円の場合（3割負担）
100万円の医療費で、自己負担（3割）が30万円かかる場合



212,570円を高額療養費として支給し、
実際の自己負担額は87,430円となります。

高額療養費制度とは？(続き)

例 1 70歳未満の場合の計算方法

適用区分		ひと月の上限額(世帯ごと)
①	年収約1,160万円～の方 健保：標準報酬月額83万円以上 国保：旧ただし書き所得901万円超	252,600円 + (医療費-842,000円)×1% 多数回該当:140,100円
②	年収約770万円～約1,160万円の方 健保：標準報酬月額53万～79万円 国保：旧ただし書き所得 600万円超～901万円	167,400円 + (医療費-558,000円)×1% 多数回該当:93,000円
③	年収約370万円～約770万円の方 健保：標準報酬月額28万～50万円 国保：旧ただし書き所得 210万円超～600万円	80,100円 + (医療費-267,000円)×1% 多数回該当:44,400円
④	～年収約370万円の方 健保：標準報酬月額26万円以下 国保：旧ただし書き所得210万円以下	57,600円 多数回該当:44,400円
⑤	住民税非課税の方	35,400円 多数回該当:24,600円

詳しくは
こちら

<http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/>

高額療養費パーフェクトマスターより

高額パーフェクト



検索

2024年11月現在



例 2 70歳以上の場合の計算方法

平成30年8月診療分から

適用区分		ひと月の上限額(世帯ごと)	
		外来(個人ごと)	
現役並み	年収約1,160万円～の方 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上	252,600円 + (医療費-842,000円) × 1% 多数回該当: 140,100円	
	年収約770万円～約1,160万円の方 標準報酬月額53万円以上 課税所得380万円以上	167,400円 + (医療費-558,000円) × 1% 多数回該当: 93,000円	
	年収約370万円～約770万円の方 標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上	80,100円 + (医療費-267,000円) × 1% 多数回該当: 44,400円	
一般	年収156万円～約370万円の方 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等	18,000円 (年間上限) (14万4千円)	57,600円 多数回該当: 44,400円
住民税非課税等	Ⅱ 住民税非課税世帯	8,000円	24,600円 多数回該当: 適用なし
	Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など)		15,000円 多数回該当: 適用なし

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局より作成

レブロジル®について、
こちらのウェブサイトでも紹介しています。
ぜひご覧ください。

レブロジル.jp | <https://reblozyl.jp/patient>



医療機関名：